

HERNIE INGUINALE PAR VOIE COELIOSCOPIQUE PRE PERITONEALE

BUT : traitement chirurgical de l'issue d'une partie de l'intestin et du péritoine par le canal inguinal.

PRINCIPE : repositionner le sac herniaire en intra abdominal et renforcer la paroi par la mise en place d'une prothèse par voie coelioscopique.

ANESTHESIE : Anesthésie générale

POSITION OPERATOIRE: Décubitus dorsal, les 2 bras le long du corps.

VOIE D'ABORD: pré péritonéale

DEROULE OPERATOIRE :

Mise en place d'un trocart diamètre 10 mm au niveau de l'ombilic.

Insufflation

Mise en place d'un trocart diamètre 5mm à mi distance entre l'ombilic et le pubis

Décollement pré péritonéal par mouvements de l'optique

Réduction du sac herniaire

Dissection du cordon

Contrôle de l'hémostase au crochet coagulateur

Introduction de la plaque enroulée par le trocart de diamètre 10.

Mise en place de la prothèse non fixée : masque l'orifice herniaire en laissant passer le cordon spermatique qui est pariétalisé.

Exsufflation

FERMETURE :

Plan sous cutané par un fil résorbable rapide

Peau par une colle dermique

Injection sous cutanée d'anesthésique local au niveau des orifices de trocarts.

Vidéo en lien : voir le site www.abcd.chirurgie.fr/points-forts.videothèque/page_4fa.html